

REGLAMENTO (CEE) N° 2268/88 DEL CONSEJO

de 19 de julio de 1988

por el que se fijan, para la cosecha de 1988, los precios de objetivo, los precios de intervención y las primas concedidas a los compradores de tabaco en hoja, los precios de intervención derivados del tabaco embalado, así como las calidades de referencia, las zonas de producción y las cantidades máximas garantizadas y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1975/87

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 43,

Visto el Reglamento (CEE) n° 727/70 del Consejo, de 21 de abril de 1970, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del tabaco crudo ⁽¹⁾, modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 2267/88 ⁽²⁾, y, en particular, el apartado 5 de su artículo 2, los apartados 4 y 5 de su artículo 4 y el apartado 8 de su artículo 6,

Vista la propuesta de la Comisión ⁽³⁾,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo ⁽⁴⁾,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social ⁽⁵⁾,

Visto el dictamen del Comité monetario,

Considerando que, al fijar los precios en el sector del tabaco bruto, procede tener en cuenta tanto los objetivos de la política agraria común como la aportación que la Comunidad pretende realizar al desarrollo armonioso del comercio mundial; que la política agraria común tiene por objetivos, en particular, garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables;

Considerando que los precios de objetivo y los precios de intervención del tabaco en hoja deben fijarse en función de los criterios contemplados en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 727/70 para estimular la orientación de la producción, en particular en el sentido de una conversión de los cultivos hacia las variedades más solicitadas y competitivas así como hacia las menos nocivas para la salud;

Considerando que es oportuno fijar asimismo, para la cosecha 1988, precios de intervención derivados para las variedades que, antes de la entrada en vigor de la organización común de mercados o, respecto de las variedades cultivadas en Grecia, en España y en Portugal, antes de la adhesión, se beneficiaban de una garantía de precios en la fase de tabaco embalado, así como para las variedades

principalmente cultivadas en Alemania, a fin de tener en cuenta las vías de comercialización existentes en dicho país;

Considerando que el apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 727/70 establece la fijación, con respecto a una cantidad global para la Comunidad según los criterios contemplados en dicho artículo, de una cantidad máxima garantizada para cada una de las variedades o grupos de variedades de tabaco de la producción comunitaria, cuyo rebasamiento acarrea una reducción proporcional de los precios de objetivo y de intervención y de las primas; que procede fijar dichas cantidades máximas garantizadas; que, sin embargo, tanto las cantidades fijadas de esta forma, como la distribución por grupo de variedades, podrán volver a examinarse, en la próxima campaña, a la luz de la experiencia adquirida y tras los programas de reconversión; que, por lo tanto, las disposiciones adoptadas de este modo únicamente serán aplicables para la cosecha de 1988;

Considerando que la prima concedida a los compradores de tabaco comunitario está destinada a que puedan pagar a los productores de tabaco en hoja un precio que se sitúe al nivel del precio de objetivo teniendo en cuenta la evolución de los precios del mercado mundial, así como el nivel de los precios resultante del juego de la oferta y la demanda en el mercado comunitario;

Considerando que los precios contemplados así como el importe de la prima deben fijarse para cada variedad producida en zonas de producción reconocidas y con relación a una calidad de referencia definida de forma que permitan una evaluación lo más objetiva posible de la calidad del tabaco;

Considerando que, para la cosecha 1988, es conveniente indicar las zonas de producción reconocidas de cada variedad de tabaco y mantener las definiciones de las calidades de referencia establecidas por el Reglamento (CEE) n° 1975/87 del Consejo, de 2 de julio de 1987, por el que se fijan, para la cosecha de 1987, los precios de objetivo, los precios de intervención y las primas concedidas a los compradores de derivados del tabaco embalado, así como las calidades de referencia y las zonas de producción y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 1577/86 ⁽⁶⁾;

Considerando que en la lista de las zonas reconocidas enumeradas en el Anexo III del Reglamento (CEE) n° 1975/87, se omite una zona de producción; que, con objeto de permitir que los productores de tabaco de dicha zona se beneficien de las medidas previstas en el mencionado Reglamento, procede modificar el Anexo en cuestión;

Considerando que el Reglamento (CEE) n° 1890/87 ⁽⁷⁾ prevé que, a partir del 1 de abril de 1988, se aplicará en el

⁽¹⁾ DO n° L 94 de 28. 4. 1970, p. 1.

⁽²⁾ Véase la página 18 del presente Diario Oficial.

⁽³⁾ DO n° C 139 de 30. 5. 1988, p. 72.

⁽⁴⁾ DO n° C 187 de 18. 7. 1988.

⁽⁵⁾ DO n° C 175 de 4. 7. 1988, p. 33.

⁽⁶⁾ DO n° L 184 de 3. 7. 1987, p. 31.

⁽⁷⁾ DO n° L 182 de 3. 7. 1987, p. 4.

sector del tabaco un nuevo tipo representativo en relación con las monedas de determinados Estados miembros; que dicha disposición daría lugar, a partir de esa fecha, a una disminución en moneda nacional de las primas fijadas en ECU para una parte importante de la cosecha de los Estados miembros cuyo tipo representativo esté revaluado; que, sin embargo, dadas las características del sector, es más apropiado garantizar el mismo trato a toda la cosecha de un año; que este objetivo puede alcanzarse, si se aplica a las primas abonadas en relación con la cosecha de 1987 el antiguo tipo de cambio, en los Estados miembros de que se trate,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Para la cosecha 1988, las calidades de referencia y las zonas de producción reconocidas para cada una de las variedades de tabaco en hoja de la producción comunitaria, contempladas en las letras b) y c) del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 727/70, se fijan en los Anexos I y III respectivamente del presente Reglamento.

Artículo 2

Para la cosecha 1988, las calidades de referencia y las zonas de producción reconocidas contempladas en las letras b) y c) del apartado 3 del artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 727/70, para cada una de las variedades de tabaco embalado de la producción comunitaria para las que se establezca un precio de intervención derivado, se fijan en los Anexos II y III respectivamente del presente Reglamento.

Artículo 3

1. Para la cosecha 1988, los precios de objetivo y de intervención y los importes de la prima concedida a los

compradores de tabaco en hoja, contemplados en los artículos 2 y 3 del Reglamento (CEE) n° 727/70, así como los precios de intervención derivados del tabaco embalado contemplados en el artículo 6 del mencionado Reglamento, se fijan en el Anexo IV del presente Reglamento.

2. Los precios y primas únicamente se aplicarán en el caso de que cada una de dichas variedades haya sido cultivada en las zonas de producción correspondientes indicadas en el Anexo III.

3. Para la cosecha 1988, las cantidades máximas garantizadas de tabaco en hoja contempladas en el apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 727/70 se fijan en el Anexo V del presente Reglamento.

Artículo 4

En el Anexo III del Reglamento (CEE) n° 1975/87 para la variedad «1. Badischer Geudertheimer y sus híbridos», las zonas de producción reconocidas para Italia se sustituyen por «Véneto, Toscana, Molise, Campania, Lacio y Apulia».

Artículo 5

El tipo de conversión que deberá aplicarse en la República Federal de Alemania a las primas que se hallen en vigor para la cosecha de tabaco de 1987, será el tipo representativo válido para dicha moneda antes del 1 de abril de 1988.

Artículo 6

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 19 de julio de 1988.

Por el Consejo
El Presidente
Y. POTTAKIS

ANEXO I

Tabaco en hoja: variedades y calidades de referencia del mismo para la cosecha de 1988

| Número de orden | Variedad | Calidad de referencia |
|-----------------|---|--|
| 1 | Badischer Geudertheimer y sus híbridos | <p>Hauptgut (Leaves) de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, intactas, de color marrón oscuro a moteado, de longitud uniforme</p> <p>Presentación: tabaco seleccionado, en manillas o en fardos provisionales, con o sin ligaduras que no son tabaco</p> <p>Humedad: 26 %</p> |
| 2 | Badischer Burley E y sus híbridos | <p>Hauptgut (Leaves) de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, intactas, carnosas, de color marrón rojizo a marrón claro, de longitud uniforme</p> <p>Presentación: tabaco seleccionado, en manillas o en fardos provisionales, con ligaduras que no son tabaco</p> <p>Humedad: 25 %</p> |
| 3 | Virgin D | <p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, intactas, de color amarillo a rojo amarillo; se admiten, hasta un límite del tercio de la superficie de la hoja, diferencias tales como coloraciones parduzcas a amarillo verdoso</p> <p>Presentación: tabaco seleccionado, en manillas o en fardos provisionales, con ligaduras que no son tabaco</p> <p>Humedad: 19 %</p> |
| 4 | <p>a) Paraguay y sus híbridos</p> <p>b) Dragon vert y sus híbridos, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre</p> | <p>Hojas medianas (Leaves) de clase 2</p> <p>Clase 2: hojas sanas que presenten ligeros defectos de coloración, del tipo de tejido, de madurez, pero de combustibilidad satisfactoria</p> <p>Presentación: tabaco seleccionado y en manillas o en hojas sueltas</p> <p>Humedad: 27 %</p> |
| 5 | Nijkerk | <p>Hojas de corona (Tips) de clase 2</p> <p>Clase 2: — ya sea hojas de segunda longitud (inferior o igual a 45 cm), de tejido muy gomoso, carnoso, íntegro, resistente y elástico, con nervios poco pronunciados, de buena madurez, que se traduzca en una coloración marrón a marrón oscuro, de color vivo</p> <p>— ya sea hojas de primera longitud (superior a 45 cm) de tejido todavía más gomoso, carnoso, más íntegro, resistente, con nervios más o menos pronunciados, de todas las coloraciones, con exclusión del verde botella</p> <p>Presentación: tabaco seleccionado y en manillas o en hojas sueltas</p> <p>Humedad: 27 %</p> |

| Número de orden | Variedad | Calidad de referencia |
|-----------------|---|---|
| 6 | a) Misionero y sus híbridos b) Río Grande y sus híbridos | Hojas de segunda calidad 2ª calidad: hojas desarrolladas, de más de 45 cm, de tejido no grueso, de coloración clara un poco amarillenta, de color vivo o bastante vivo, que tenga suficiente firmeza y sea bastante íntegro, de combustibilidad pasable Presentación: tabaco seleccionado y en manillas o en hojas sueltas Humedad: 27 % |
| 7 | Bright | Hojas de categoría A Categoría A: hojas de madurez suficiente, sin defectos de curado, de textura abierta, con nervios centrales y nervios no demasiado acentuados, sanas, de color amarillo en sus diferentes gradaciones Presentación: en fardos provisionales de 30 a 40 kg Humedad: 16 % |
| 8 | Burley I | Hojas de categoría A Categoría A: hojas de madurez suficiente, sin defectos de curado, de textura abierta, incluso consistentes, con los nervios centrales y nervios no demasiado acentuados, sanas, de color avellana más o menos vivo Presentación: en fardos provisionales de 30 a 40 kg o en manillas con ligaduras que no son tabaco (fascicoli) de 25 a 30 hojas Humedad: 19 % |
| 9 | Maryland | Hojas de categoría A Categoría A: hojas de madurez suficiente que presenten ligeros defectos de secado, con muy pocas tonalidades color avellana, de tejido de textura mediana con los nervios centrales y los nervios no demasiado acentuados, sanas, de coloración marrón rojizo, más bien vivo Presentación: en fardos provisionales de 30 a 40 kg o en manillas con ligaduras que no son tabaco (fascicoli) de 25 a 30 hojas Humedad: 19 % |
| 10 | a) Kentucky y sus híbridos b) Moro di Cori c) Salento | Hojas de categoría B Categoría B: hojas de buena madurez, de tejido consistente, sin defectos de curado y de conservación, de color marrón, que presenten algunos defectos de integridad, de buena combustibilidad Presentación: en manillas con ligaduras que no son tabaco (fascicoli) de 25 a 30 hojas Humedad: 23 % |

| Número de orden | Variedad | Calidad de referencia |
|-----------------|--|---|
| 11 | a) Forchheimer Havana II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano | Hojas de categoría B Categoría B: hojas de tejido consistente o ligero, sanas, sin defectos de curado, de color marrón verdoso, que presenten defectos de integridad Presentación: tabaco seleccionado, en manillas o en fardos provisionales con ligaduras que no son tabaco Humedad: 26 % |
| 12 | a) Beneventano b) Brasile Selvaggio y variedades similares | Hojas de categoría B Categoría B: hojas de madurez suficiente de tejido consistente o incluso grueso o fino, que presenten defectos no acentuados de curado, de fermentación y de integridad Presentación: en manillas con ligaduras que no son tabaco (fascicoli) de 25 a 30 hojas Humedad: 24 % |
| 13 | Xanti-Yaká | Hojas de categoría B Categoría B: hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles, de forma oval elíptica, con los nervios centrales poco acentuados y los nervios secundarios con un ángulo más bien abierto, que pueden presentar algunos defectos de curado, de tejido la mayoría de las veces ligero, de color que va del amarillo al marrón, con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliares, de gusto discreto, de aroma suficiente y de buena combustibilidad La longitud de las hojas medianas no supera los 20 cm Presentación: en fardos provisionales de 15 a 20 kg o en cajas que contengan guirnaldas de hojas de 30 a 40 kg Humedad: 17 % |
| 14 | a) Perustitza b) Samsun | Hojas de categoría B Categoría B: hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles (Perustitza) o pecioladas (Samsun) de forma elíptica lanceolada con la punta afilada (Perustitza) o elíptica redondeada (Samsun), con los nervios centrales poco acentuados y los nervios secundarios con un ángulo tendente al agudo, que pueden presentar algunos defectos de curado, de tejido la mayoría de las veces ligero, de color que va del amarillo al marrón (Perustitza) o tendente al parduzco (Samsun), con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliares, de gusto discreto, de aroma suficiente y de buena combustibilidad La longitud de las hojas medianas no supera los 25 cm Presentación: en fardos provisionales de 15 a 20 kg o en cajas que contengan guirnaldas de hojas de 30 a 40 kg Humedad: 17 % |

| Número de orden | Variedad | Calidad de referencia | | | | | | |
|--|--|---|--|-----|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|----|
| 15 | Erzegovina y variedades similares | <p>Hojas de categoría B</p> <p>Categoría B: hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles, de forma oval o elíptica con los nervios centrales medianamente acentuados y con los nervios secundarios en ángulo más bien abierto, que puede presentar algunos defectos de curado, de tejido la mayoría de las veces ligero, de color que va del amarillo al marrón, con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliares, de gusto discreto, de aroma suficiente y de buena combustibilidad</p> <p>La longitud de las hojas medianas no supera los 35 cm</p> <p>Presentación: en fardos provisionales de 15 a 20 kg o en cajas que contengan guirnaldas de hojas de 30 a 40 kg</p> <p>Humedad: 17%</p> | | | | | | |
| 16 | a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I | <p>Hojas de categoría B</p> <p>Categoría B: hojas medianas inferiores seleccionadas por longitud de acuerdo con las proporciones siguientes:</p> <table data-bbox="852 927 1453 1032"> <tr> <td>1ª longitud (igual o superior a 38 cm)</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2ª longitud (de 32 a menos de 38 cm)</td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td>3ª longitud (de 25 a menos de 32 cm)</td> <td>5%</td> </tr> </table> <p>Hojas de dimensión conveniente, de buena madurez y de color uniforme, sanas, sin defectos de integridad, de textura fina, elástica y resistente, con los nervios centrales y los nervios poco pronunciados, de buena fermentación y bien conservadas, de buena combustibilidad, de gusto y aroma típicos, utilizables para el encapado de cigarros, que incluyan aproximadamente un 25% de hojas no íntegras</p> <p>Presentación: en manillas con ligaduras que no son tabaco (fascicoli)</p> <p>Humedad: 22%</p> | 1ª longitud (igual o superior a 38 cm) | 60% | 2ª longitud (de 32 a menos de 38 cm) | 35% | 3ª longitud (de 25 a menos de 32 cm) | 5% |
| 1ª longitud (igual o superior a 38 cm) | 60% | | | | | | | |
| 2ª longitud (de 32 a menos de 38 cm) | 35% | | | | | | | |
| 3ª longitud (de 25 a menos de 32 cm) | 5% | | | | | | | |
| 17 | Basma | <p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 15 cm de longitud, de color amarillo oro, anaranjado a rojo amarillo, de buena elasticidad y brillantes, bastante carnosas; estructura floja y buena textura; de aroma típico y acusado, de buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 45% de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras, que presenten ligeros defectos de integridad y/o curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 20 cm de longitud, de color amarillo claro, verde claro, rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja y de buena textura, de elasticidad media, moderadamente brillantes, moderadamente carnosas, de aroma típico y acusado, de muy buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55% de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos de 15 a 25 kg, presentados de la forma tradicional en dos filas de «pastali» (en hojas alineadas). (Es conveniente señalar que en los distritos de Astakós y Jrisúpoli la presentación se hace en armatodema)</p> <p>Humedad: 17%</p> | | | | | | |

| Número de orden | Variedad | Calidad de referencia |
|-----------------|--|---|
| 18 | Katerini y variedades similares | <p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 20 cm de longitud, de color amarillo claro o anaranjado a rojizo, de estructura floja, de buena elasticidad, brillantes, bastantes carnosas, de buena textura y muy buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 45 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras, que presenten ligeros defectos de integridad y/o curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo, anaranjado, verde amarillo, rojizo o marrón claro, de estructura floja, moderadamente carnosas, de elasticidad media y brillantes, de buena textura y de muy buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: generalmente las guirnaldas se juntan de acuerdo con la forma de presentación «Baski» antes del embalaje.</p> <p>Presentación en fardos de 25 a 35 kg de acuerdo con la forma tradicional llamada «Kaloup»</p> <p>Humedad: 16 %</p> |
| 19 | a) Kaba Koulac clásico b) Ellassona | <p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción de las hojas de corona, que tengan hasta 25 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y hasta 20 cm de longitud para Ellassona, Karatzova y Kontoula, de color amarillo medio a oscuro, de buena elasticidad y brillantes, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras, que presenten ligeros defectos de integridad y/o curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 30 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y 25 cm de longitud para Ellassona, Karatzova y Kontoula, de color amarillo, verde amarillo, rojizo, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, de elasticidad media y moderadamente brillantes, de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 53 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos de 15 a 30 kg, presentadas de la forma tradicional en dos filas de armatodema</p> <p>Humedad: 17 %</p> |
| 20 | a) Kaba Koulak no clásico b) Myrodata Smyrne, Trapezous y Phi I | <p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción de las hojas de corona, que tengan hasta 30 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y Trapezous, hasta 20 cm para Phi I y hasta 15 cm para Myrodata Smyrne, de color amarillo claro a rojizo, de buena elasticidad y brillantes de estructura bastante floja, de buena textura y excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten algunos defectos de curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 35 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y Trapezous, hasta 25 cm para Phi I y hasta 20 cm para Myrodata Smyrne, de color amarillo, verde</p> |

| Número de orden | Variedad | Calidad de referencia |
|-----------------|--|---|
| 20 (cont.) | a) Kaba Koulak no clásico b) Myrodata Smyrne, Trapezous y Phi I | <p>amarillo o marrón claro, de textura bastante floja, de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, de muy buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 53 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos de 25 a 35 kg, presentadas de la forma tradicional en armatodema, o de 35 a 50 kg en la forma de Kaloup</p> <p>Humedad: 17 %</p> |
| 21 | Myrodata Agrinion | <p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo o anaranjado oscuro, de buena elasticidad y brillantes, de textura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de secado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 30 cm de longitud, de color amarillo, verde amarillo o rojizo claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 53 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos de 15 a 30 kg presentadas de la forma tradicional en dos filas de armatodema</p> <p>Humedad: 15 %</p> |
| 22 | Zichnomyrodata | <p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción de las hojas de corona, que tengan hasta 20 cm de longitud, de color amarillo claro a anaranjado claro, de buena elasticidad y brillantes, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado y algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo, verde amarillo o rojizo claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastante elásticas y bastante brillantes, de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 53 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos de 15 a 30 kg presentadas de la forma tradicional en dos filas de armatodema</p> <p>Humedad: 17 %</p> |
| 23 | Tsebelia | <p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero, que tengan hasta 35 cm de longitud, de color rojo amarillo, naranja a rojizo, de estructura floja, de buena elasticidad y brillantes, bastante carnosas, de buena textura y de muy buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 45 % de la calidad I/III</p> |

| Número de orden | Variedad | Calidad de referencia |
|-----------------|-------------|---|
| 23 (cont.) | Tsebelia | <p>Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 40 cm de longitud, de color amarillo claro, verde amarillo, rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja, bastante elásticas y de brillo medio, bastante carnosas, de bastante buena textura y de muy buena combustibilidad. Esta categoría también comprende las hojas ligeramente desecadas y/o que presenten ligeros defectos de integridad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos de 30 a 40 kg, presentadas en dos filas de armatodema</p> <p>Humedad: 14 %</p> |
| 24 | Mavra | <p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con excepción del primero (protomana), que tengan hasta 30 cm de longitud, de un color que va de rojizo amarillo al naranja y al rojizo, de estructura floja, de buena textura, de buena elasticidad y brillantes, bastante carnosas y de buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 45 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 40 cm de longitud, de color amarillento, verde amarillo (limón), rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, bastante carnosas y de buena combustibilidad. Esta categoría también comprende las hojas ligeramente desecadas y/o que presenten ligeros defectos de integridad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos de 30 a 50 kg presentados en dos filas de armatodema</p> <p>Humedad: 14 %</p> |
| 25 | Burley EL | <p>Hojas de la calidad A</p> <p>Calidad A: hojas completamente maduras, completamente desarrolladas, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes del piso medio, de color uniforme marrón avellana medio a rojo avellana, de estructura floja, de buena textura y excelente combustibilidad</p> <p>Presentación: en fardos de 50 a 70 kg presentados en dos filas de armatodema sin bramante (hojas sueltas)</p> <p>Humedad: 22 %</p> |
| 26 | Virginia EL | <p>Hojas de la calidad A</p> <p>Calidad A: hojas completamente maduras, completamente desarrolladas, sanas, íntegras, sin defectos de curado, de color uniforme amarillo limón a naranja medio, carnosas, de buena textura y de buena combustibilidad, procedentes esencialmente del piso medio</p> <p>Presentación: en fardos de 30 a 40 kg, presentadas en dos filas de armatodema, sin bramante (hojas sueltas)</p> <p>Humedad: 19 %</p> |

| Número de orden | Variedad | Calidad de referencia |
|-----------------|-------------------|---|
| 27 | Santa Fe | <p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, sin defectos de curado, con la vena central totalmente rendida, color marrón, con algunos defectos de integridad</p> <p>Presentación: tabaco seleccionado, en fardos provisionales homogéneos</p> <p>Humedad: 18 %</p> |
| 28 | Burley fermentado | <p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, sin defectos de curado, con la vena central totalmente rendida, con buena combustibilidad, de color avellana a canela, con algunos defectos de integridad</p> <p>Presentación: tabaco seleccionado, en fardos provisionales homogéneos</p> <p>Humedad: 18 %</p> |
| 29 | Havana E | <p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, tejido fino, con la vena central y las nervaduras poco acentuadas, sin defectos de curado, con la vena totalmente rendida, color marrón, marrón claro o verdoso, con algún defecto de integridad</p> <p>Presentación: tabaco seleccionado, en fardos provisionales uniformes</p> <p>Humedad: 18 %</p> |
| 30 | Round Scafati | <p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas de dimensión suficiente, de buena madurez, de color uniforme, sanas, sin defectos de integridad, de tejido fino, elásticas y resistentes, con la vena central y las nervaduras finas, bien conservadas, de buena combustibilidad, de gusto y aroma típicos, aptas para cajas de cigarrillos. Se puede tolerar un porcentaje de hojas no íntegras del 25 % aproximadamente</p> <p>Presentación: en fardos homogéneos provisionales, conteniendo manojos atados con ligaduras que no son de tabaco</p> <p>Humedad: 18 %</p> |
| 31 | Virginia E | <p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas de madurez suficiente, sin defectos de curado, de textura abierta, con la vena poco central y las nervaduras poco acentuadas, sanas, de color amarillo limón o naranja</p> <p>Presentación: en fardos homogéneos provisionales de 35 a 45 kg de hojas sueltas y separadas por pisos foliares</p> <p>Humedad: 16 %</p> |
| 32 | Burley E | <p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas de suficiente madurez, sin defecto de curado, de textura abierta, con vena central y secundarias poco acentuadas, sanas, de color canela en sus diferentes tonos</p> <p>Presentación: en fardos homogéneos de 35 a 45 kg de hojas sueltas y separadas por pisos foliares</p> <p>Humedad: 18 %</p> |

| Número de orden | Variedad | Calidad de referencia |
|-----------------|------------|---|
| 33 | Virginia P | <p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, de textura abierta y elástica, de color brillante, de longitud superior a 40 cm, el primer y el último pisos foliares no incluidos</p> <p>Presentación: en fardos provisionales de 45 kg con las hojas ordenadas</p> <p>Humedad: 17%</p> |
| 34 | Burley P | <p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, textura abierta y elástica, color brillante, longitud superior a 40 cm, el primer y último pisos foliares no incluidos</p> <p>Presentación: en fardos provisionales de 35 kg con las hojas ordenadas</p> <p>Humedad: 22%</p> |

ANEXO II

Tabaco embalado: variedades y calidades de referencia del mismo para la cosecha de 1988

| Número de orden | Variedad | Calidad de referencia |
|-----------------|--|---|
| 1 | Badischer Geudertheimer y sus híbridos | <p>Hauptgut (Leaves) de la clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, intactas, de color ligeramente moteado a marrón oscuro, de longitud uniforme, normalmente fermentadas</p> <p>Presentación: en fardos, en cajas o en cartones de 75 a 200 kg aproximadamente o en barricas de 225 a 450 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 16 %</p> |
| 2 | Badischer Burley E y sus híbridos | <p>Hauptgut (Leaves) de la clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, intactas, carnosas, de color marrón claro, marrón rojizo a marrón oscuro, de longitud uniforme, normalmente fermentadas</p> <p>Presentación: en fardos o cajas de 75 a 175 kg aproximadamente o en barricas de 225 a 450 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 15 %</p> |
| 3 | Virgin D | <p>Hojas de la clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, intactas, de color amarillo, rojo amarillo a amarillo parduzco, normalmente fermentadas</p> <p>Presentación: en fardos o en cajas de 75 a 175 kg aproximadamente o en barricas de 225 a 450 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p> |
| 7 | Bright | <p>Hojas de categoría A</p> <p>Categoría A: hojas de madurez suficiente, sin defectos de manipulación, de textura abierta, con los nervios centrales y los nervios no demasiado acentuados, sanas, de color amarillo en sus diferentes gradaciones</p> <p>Presentación: en barricas de 280 a 450 kg aproximadamente o en cartones de 150 a 210 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p> |
| 8 | Burley I | <p>Hojas de categoría A</p> <p>Categoría A: hojas de madurez suficiente, sin defectos de manipulación de textura abierta, incluso consistentes, con los nervios centrales y los nervios no demasiado acentuados, de color avellana más o menos vivo</p> <p>Presentación: en barricas de 280 a 450 kg aproximadamente o en cartones de 150 a 210 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p> |

| Número de orden | Variedad | Calidad de referencia |
|-----------------|--|--|
| 9 | Maryland | <p>Hojas de categoría A</p> <p>Categoría A: hojas de madurez suficiente, que presenten ligeros defectos de curado, incluso con muy poca tonalidad color avellana, de tejido de textura media con los nervios centrales y los nervios no demasiado acentuados, sanas, de coloración marrón rojiza más o menos viva</p> <p>Presentación: en barricas de 280 a 450 kg aproximadamente o en cartones de 150 a 210 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p> |
| 10 | a) Kentucky y sus híbridos b) Moro di Cori c) Salento | <p>Hojas de categoría B</p> <p>Categoría B: hojas de buena madurez, de tejido consistente, sin defectos de curado y de conservación, de color marrón, que presenten algunos defectos de integridad, de buena combustibilidad</p> <p>Presentación: en barricas de 280 a 450 kg aproximadamente o en fardos de 170 a 200 kg aproximadamente o en cartones de 150 a 200 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 16 %</p> |
| 11 | a) Forchheimer Havana II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano | <p>Hojas de categoría B</p> <p>Categoría B: hojas de tejido consistente o ligero, sanas, sin defectos de curado, de color marrón a verdoso, que presenten defectos de integridad</p> <p>Presentación: en fardos, cajas o cartones de 75 a 200 kg aproximadamente o en barricas de 225 a 450 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 16 %</p> |
| 12 | a) Beneventano b) Brasile Selvaggio y variedades similares | <p>Hojas de categoría B</p> <p>Categoría B: hojas de madurez suficiente, de tejido consistente o incluso grueso o fino, que presenten defectos de manipulación, de fermentación y de integridad no demasiado acentuados</p> <p>Presentación: en fardos de 120 kg aproximadamente o en barricas de 330 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 16 %</p> |
| 13 | Xanti-Yakà | <p>Hojas de categoría B</p> <p>Categoría B: hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles, de forma oval elíptica, con los nervios centrales poco acentuados y los nervios secundarios de ángulo más bien abierto, que puedan presentar algunos defectos de curado, de tejido ligero la mayoría de las veces, de color que va del amarillo al marrón, con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliares, de gusto discreto, de aroma suficiente y de buena combustibilidad</p> <p>La longitud de las hojas medianas no supera los 20 cm</p> <p>Presentación: fardos pequeños de 18 a 50 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p> |

| Número de orden | Variedad | Calidad de referencia | | | | | | |
|--|--|--|--|------|--------------------------------------|------|-----------------------------|-----|
| 14 | a) Perustitza b) Samsun | <p>Hojas de categoría B</p> <p>Categoría B: hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles (Perustitza) o pecioladas (Samsun), de forma elíptica lanceolada con la punta afilada (Perustitza) o elíptica redondeada (Samsun), con los nervios centrales poco acentuados y los nervios secundarios con un ángulo tendente al agudo, que puedan presentar algunos defectos de curado, de tejido la mayoría de las veces ligero, de color que va del amarillo al marrón (Perustitza) o tendente al rojizo (Samsun), con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliares, de gusto discreto, de aroma suficiente y de buena combustibilidad</p> <p>La longitud de las hojas medianas no supera los 25 cm</p> <p>Presentación: fardos pequeños de 18 a 50 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p> | | | | | | |
| 15 | Erzegovina y variedades similares | <p>Hojas de categoría B</p> <p>Categoría B: hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles, de forma oval o elíptica, con los nervios centrales medianamente acentuados y los nervios secundarios en ángulo más bien abierto, que puedan presentar algunos defectos de curado, de tejido la mayoría de las veces ligero, de color que va del amarillo al marrón, con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliares, de gusto discreto, de aroma suficiente y de buena combustibilidad</p> <p>La longitud de las hojas medianas no supera los 35 cm</p> <p>Presentación: fardos pequeños de 18 a 50 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p> | | | | | | |
| 16 | a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I | <p>Hojas de categoría B</p> <p>Categoría B: hojas medianas inferiores seleccionadas por longitud de acuerdo con las proporciones siguientes:</p> <table data-bbox="837 1417 1439 1518"> <tr> <td>1ª longitud (igual o superior a 38 cm)</td> <td>60 %</td> </tr> <tr> <td>2ª longitud (de 32 a menos de 38 cm)</td> <td>35 %</td> </tr> <tr> <td>3ª longitud (de 25 a 32 cm)</td> <td>5 %</td> </tr> </table> <p>Hojas de dimensión conveniente, de buena madurez y de color uniforme, sanas, sin defectos de integridad, de textura fina, elástica y resistente, con los nervios centrales y los nervios poco pronunciados, de buena fermentación y bien conservadas, de buena combustibilidad, de gusto y aroma típicos, utilizables para el encapado de cigarros, que incluyan aproximadamente un 25 % de hojas no íntegras</p> <p>Presentación: en fardos de 70 a 90 kg aproximadamente o en cartones de 180 a 210 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 16 %</p> | 1ª longitud (igual o superior a 38 cm) | 60 % | 2ª longitud (de 32 a menos de 38 cm) | 35 % | 3ª longitud (de 25 a 32 cm) | 5 % |
| 1ª longitud (igual o superior a 38 cm) | 60 % | | | | | | | |
| 2ª longitud (de 32 a menos de 38 cm) | 35 % | | | | | | | |
| 3ª longitud (de 25 a 32 cm) | 5 % | | | | | | | |
| 17 | Basmás | <p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 15 cm de longitud, de color amarillo oro, anaranjado a rojo amarillo, de buena elasticidad y brillantes, bastante carnosas, estructura floja y buena textura, de aroma típico y acusado, de buena combustibilidad</p> | | | | | | |

| Número de orden | Variedad | Calidad de referencia |
|-----------------|---------------------------------------|---|
| 17 (cont.) | Basma | <p>Las hojas anteriormente descritas (I/II) constituirán el 45 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten unos ligeros defectos de curado, algunas señales de enfermedad, que tengan hasta 20 cm de longitud, de color amarillo claro, rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja y de buena textura, de elasticidad y brillo medios, moderadamente carnosas, de aroma típico y acusado, de muy buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas (III) constituirán el 55 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p> |
| 18 | Katerini y variedades similares | <p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 20 cm de longitud, de color amarillo claro o anaranjado a rojizo, de estructura floja, de buena elasticidad, brillantes, bastante carnosas, de buena textura y muy buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas (I/II) constituirán el 45 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras, que presenten unos ligeros defectos de integridad y de curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo, anaranjado, verde amarillo, rojizo o marrón claro, de estructura floja, de elasticidad media y brillantes, bastante carnosas, de buena textura y de muy buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg cada uno aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p> |
| 19 | a) Kaba Koulak clásico b) Elassona | <p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción de las hojas de corona, que tengan hasta 25 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y hasta 20 cm de longitud para Elassona, Karatzova y Kontoula, de color amarillo medio a oscuro, de buena elasticidad y brillantes, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras, que presenten unos ligeros defectos de integridad y/o curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 30 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y 25 cm de longitud para Elassona, Karatzova y Kontoula, de color amarillo a rojizo, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, de elasticidad media y brillantes, de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 53 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg cada uno aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p> |

| Número de orden | Variedad | Calidad de referencia |
|-----------------|--|--|
| 20 | a) Kaba Koulak no clásico b) Myrodata Smyrne, Trapezous y Phi I | <p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción de las hojas de corona, que tengan hasta 30 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y Trapezous, hasta 20 cm para Phi I y hasta 15 cm para Myrodata Smyrne, de color amarillo claro a rojizo, de buena elasticidad y brillantes, de estructura bastante floja, de buena textura y excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas (I/II) constituirán el 47 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 35 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y Trapezous, hasta 25 cm para Phi I y hasta 20 cm para Myrodata Smyrne, de color amarillo a marrón claro, de estructura bastante floja, de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, de muy buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas (III) constituirán el 53 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg cada uno aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p> |
| 21 | Myrodata Agrinion | <p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo a anaranjado oscuro, de buena elasticidad y brillantes, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas (I/II) constituirán el 47 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de secado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 30 cm de longitud, de color amarillo a rojizo claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas (III) constituirán el 53 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 14 %</p> |
| 22 | Zichnomyrodata | <p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción de las hojas de corona, que tengan hasta 20 cm de longitud, de color amarillo claro a naranja claro, de buena elasticidad y brillantes, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo a rojizo claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, de excelente combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas (III) constituirán el 53 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p> |

| Número de orden | Variedad | Calidad de referencia |
|-----------------|-------------|---|
| 23 | Tsebelia | <p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 30 cm de longitud, de color rojo amarillo, naranja a rojizo, de estructura floja, elásticas y brillantes, bastante carnosas, de buena textura y de muy buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas (I/II) constituirán el 45 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 40 cm de longitud, de color amarillo claro a rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja, bastante elásticas y bastante brillantes, bastante carnosas, de bastante buena textura y de muy buena combustibilidad. Esta categoría también comprende las hojas ligeramente desecadas por enfermedades y/o que presenten ligeros defectos de integridad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p> |
| 24 | Mavra | <p>Hojas de la calidad I/III</p> <p>Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con excepción del primero (protomana), que tengan hasta 30 cm de longitud, de un color que va del rojo amarillo o naranja al rojizo, de estructura floja, de buena de textura, elásticas y brillantes, bastante carnosas, de buena combustibilidad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 45 % de la calidad I/III</p> <p>Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 40 cm de longitud, de color amarillento a rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, bastante carnosas y de buena combustibilidad. Esta categoría también comprende las hojas ligeramente desecadas por las enfermedades y/o que presenten ligeros defectos de integridad</p> <p>Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III</p> <p>Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p> |
| 25 | Burley EL | <p>Hojas de la calidad A</p> <p>Calidad A: hojas completamente maduras, completamente desarrolladas, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes del piso medio, de color uniforme que va del marrón avellana medio al rojo avellana medio, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad</p> <p>Presentación: en fardos de 100 kg aproximadamente o en cajas de 200 kg aproximadamente o en barricas de 240 a 280 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p> |
| 26 | Virginia EL | <p>Hojas de la calidad A</p> <p>Calidad A: hojas completamente maduras, completamente desarrolladas, procedentes del piso medio, sanas, íntegras, sin defectos de curado, de color amarillo uniforme que va del amarillo limón al naranja medio, de buena textura y de buena combustibilidad</p> <p>Presentación: en fardos de 100 kg aproximadamente</p> <p>Humedad: 13 %</p> |

| Número de orden | Variedad | Calidad de referencia |
|-----------------|-------------------|---|
| 27 | Santa Fe | <p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, bien fermentadas, color marrón o marrón oscuro, con algunos defectos de integridad</p> <p>Presentación: en fardos de 80 a 100 kg o en cajas de cartón de 150 a 210 kg</p> <p>Humedad: 14 %</p> |
| 28 | Burley fermentado | <p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, bien fermentadas y de color marrón, con algunos defectos de integridad</p> <p>Presentación: en fardos de 80 a 100 kg o en cajas de cartón de 150 a 210 kg</p> <p>Humedad: 14 %</p> |
| 29 | Havana E | <p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sanas, de textura fina, con la vena central y las nervaduras no muy acentuadas, bien fermentadas, de color marrón, marrón claro o de tonos verdosos, con algún defecto de integridad</p> <p>Presentación: en fardos de 80 a 100 kg o en cartones de 150 a 210 kg</p> <p>Humedad: 14 %</p> |
| 30 | Round Scafati | <p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas de dimensión suficiente, de buena madurez, de color uniforme, sanas, sin defectos importantes de integridad, de textura fina, elásticas y resistentes, con la vena central y las nervaduras finas, bien conservadas, de buena combustibilidad, de gusto y aroma típicos, bien fermentadas, utilizables para capas de cigarrillos. Se puede tolerar un porcentaje de hojas no íntegras del 25 % aproximadamente</p> <p>Presentación: en fardos de 70 a 100 kg o en cartones de 180 a 210 kg</p> <p>Humedad: 14 %</p> |
| 31 | Virginia E | <p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas de madurez suficiente, de textura abierta, con la vena central y las nervaduras poco acentuadas, sanas, de color amarillo con diferentes tonos, desde el amarillo limón al naranja</p> <p>Presentación: en cartones de 170 a 210 kg</p> <p>Humedad: 14 %</p> |
| 32 | Burley E | <p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas de madurez suficiente, de textura abierta, con la vena central y las nervaduras poco acentuadas, sanas, de color canela en sus diferentes tonos</p> <p>Presentación: en cartones de 150 a 210 kg</p> <p>Humedad: 14 %</p> |

| Número de orden | Variedad | Calidad de referencia |
|-----------------|------------|--|
| 33 | Virginia P | <p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sin defectos de manipulación, de textura abierta y elástica, aceitosas, de color amarillo limón o naranja, brillante, longitud superior a 40 cm, el primer y el último pisos foliculares no incluidos</p> <p>Presentación: en cartones de hojas sueltas de 200 kg</p> <p>Humedad: 12,5%</p> |
| 34 | Burley P | <p>Hojas de clase 1</p> <p>Clase 1: hojas maduras, sin defectos de manipulación, de textura abierta y elástica, color brillante, longitud superior a 40 cm, el primer y el último pisos foliculares no incluidos</p> <p>Presentación: en cartones de hojas sueltas de 180 kg</p> <p>Humedad: 13%</p> |

ANEXO III

Zonas de producción reconocidas para cada una de las variedades de tabaco de la producción comunitaria

| Variedad | País | Zonas de producción |
|---|------------------------------|---|
| 1. Badischer Geudertheimer y sus híbridos | RFA Francia Italia | Planicie renana y valles adyacentes, Franconia central Nord-Pas-de-Calais, Picardía, Champagne-Ardenas, Alsacia-Lorena, Valle del Loira y Poitou-Breñaña Véneto, Toscana, Molise, Campania, Lacio y Apulia |
| 2. Badischer Burley y sus híbridos | RFA Francia Italia | Planicie renana y valles adyacentes, Franconia central Aquitania, Mediodía-Pirineos, Auvernia-Lemosín, Alsacia-Lorena, Ródano-Alpes, Franco-Condado, Valle del Loira, Centro, Poitou-Breñaña, Borgoña y Charente Piamonte, Lombardía, Véneto y Emilia-Romaña |
| 3. Virgin D | RFA Francia | Schleswig-Holstein, Baja-Sajonia, Franconia, planicie renana y valles adyacentes Aquitania, Mediodía-Pirineos, Auvernia-Lemosín, Champagne-Ardenas, Alsacia-Lorena, Ródano-Alpes, Franco-Condado, Provenza, Valle del Loira, Centro, Poitou Breñaña, Charente, Languedoc-Rosellón, Normandía, Borgoña, Nord-Pas-de-Calais y Picardía |
| 4. a) Paraguay y sus híbridos | Francia Bélgica Italia | Aquitania, Mediodía-Pirineos, Languedoc-Rosellón, Auvernia-Lemosín, Poitou-Breñaña, Charente, Valle del Loira, Centro, Ródano-Alpes, Provenza, Franco-Condado, Alsacia-Lorena, Champagne-Ardenas, Picardía, Nord-Pas-de-Calais, Normandía y Borgoña Flandes Molise y Campania |
| b) Dragón verde y sus híbridos, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre | Francia Bélgica | Nord-Pas-de-Calais, Picardía, Champagne, Ardenas, Valle del Loira Flandes, Hainaut, Namur, Luxemburgo |
| 5. Nijkerk | Francia | Departamentos de Lot y Aveyron |
| 6. Misionero | Francia | Isla de la Reunión |
| 7. Bright | Italia | Friul, Véneto, Lombardía, Piamonte, Toscana, Marcas, Umbría, Lacio, Abruzos, Molise, Campania, Basilicata, Apulia y Calabria |
| 8. Burley I | Italia | Véneto, Lombardía, Piamonte, Umbría, Emilia-Romaña, Lacio, Abruzos, Molise, Campania, Basilicata, Apulia y Sicilia |
| 9. Maryland | Italia | Friul, Lombardía, Toscana, Marcas, Umbría, Lacio, Molise y Campania |
| 10. Kentucky | Italia España | Toscana, Umbría, Lacio, Campania y Véneto Extremadura y Andalucía |
| 11. F. Havana | Italia | Friul, Trento, Véneto, Toscana, Lacio, Molise y Campania |
| 12. Beneventano Brasile selvaggio | Italia | Campania Sicilia |
| 13. Xanti-Yakà | Italia | Abruzos, Campania, Basilicata y Apulia |
| 14. a) Perustitza b) Samsun | Italia | Lacio, Abruzos, Molise, Campania, Apulia y Sicilia |
| 15. Erzegovina | Italia | Lacio, Abruzos y Apulia |

| Variedad | País | Zonas de producción |
|--|------------------|---|
| 16. Round Tip | Grecia Italia | Macedonia central Campania |
| 17. Basma | Grecia | Tracia, Macedonia, Sterea Hellas y Tesalia |
| 18. a) Katerini b) Variedades similares | Grecia | Macedonia Macedonia, Sterea Hellas, Epiro y Tesalia |
| 19. a) Kaba Koulak Clásico b) Elassona | Grecia Grecia | Macedonia Tesalia |
| 20. Kaba Koulak no Clásico | Grecia | Macedonia, Tesalia, Sterea Hellas, Tracia, Epiro, Peloponeso y las islas |
| 21. Myrodata Agrinion | Grecia | Sterea Hellas |
| 22. Zichnomyrodata | Grecia | Tesalia |
| 23. Tsebelia | Grecia | Epiro y Sterea Hellas |
| 24. Mavra | Grecia | Tesalia, Peloponeso y Sterea Hellas |
| 25. Burley EL | Grecia | Macedonia, Tesalia |
| 26. Virginia EL | Grecia | Sterea Hellas, Tesalia, Macedonia, Tracia, Peloponeso |
| 27. Santa Fe | España | Andalucía |
| 28. Burley Fermentado | España | Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, Rioja, Cataluña, Madrid |
| 29. Havana E | España | Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra |
| 30. Round Scafati | España | Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Cantabria |
| 31. Virginia E | España | Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha |
| 32. Burley E | España | Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha |
| 33. Virginia P | Portugal | Beira Interior, Ribatejo Oeste, Alentejo, Región Autónoma de las Azores |
| 34. Burley P | Portugal | Beiras, Ribatejõ Oeste, Entre Duero y Miño, Tras os Montes, Región Autónoma de las Azores |

ANEXO IV

Precios de objetivo, precios de intervención y primas para los tabacos en hoja de la cosecha 1988

Precios de intervención derivados para los tabacos embalados de la cosecha 1988

(en ECU/kg)

| Número de orden | Variedades | Precios de objetivo | Precios de intervención | Importe de la prima | Precios de intervención derivados |
|-----------------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1 | Badischer Geudertheimer y sus híbridos | 3,643 | 3,097 | 2,534 | 4,644 |
| 2 | Badischer Burley E y sus híbridos | 4,512 | 3,835 | 2,961 | 5,426 |
| 3 | Virgin D | 4,626 | 3,932 | 2,927 | 5,179 |
| 4 | a) Paraguay y sus híbridos b) Dragon vert y sus híbridos, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre | 3,400 | 2,890 | 2,352 | - |
| 5 | Nijkerk | 3,357 | 2,853 | 2,132 | - |
| 6 | a) Misionero y sus híbridos b) Río Grande y sus híbridos | 3,128 | 2,659 | 2,159 | - |
| 7 | Bright | 4,070 | 3,459 | 2,461 | 4,764 |
| 8 | Burley I | 2,848 | 2,421 | 1,653 | 3,565 |
| 9 | Maryland | 3,313 | 2,816 | 1,875 | 4,014 |
| 10 | a) Kentucky y sus híbridos b) Moro di Cori c) Salento | 2,796 | 2,376 | 1,765 | 3,347 |
| 11 | a) Forchheimer Havana II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano | 2,707 | 2,301 | 1,909 | 3,614 |
| 12 | a) Beneventano b) Brasile Selvaggio y variedades similares | 1,462 | 1,243 | 1,077 | 2,012 |
| 13 | Xanti-Yakà | 3,257 | 2,768 | 2,399 | 4,521 |
| 14 | a) Perustitza b) Samsun | 3,083 | 2,621 | 2,283 2,222 | 3,925 3,949 |
| 15 | Erzegovina y variedades similares | 2,770 | 2,355 | 2,057 | 3,540 |
| 16 | a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I | 15,908 | 13,522 | 9,608 | 20,782 |
| 17 | Basmas | 6,090 | 5,177 | 3,072 | 6,914 |
| 18 | Katerini y variedades similares | 5,073 | 4,312 | 2,734 | 6,196 |
| 19 | a) Kaba Koulak clásico b) Elassona | 4,022 | 3,419 | 2,078 | 4,925 |
| 20 | a) Kaba Koulak no clásico b) Myrodata Smyrne, Trapezous y Phi 1 | 3,030 | 2,576 | 1,423 | 3,979 |
| 21 | Myrodata Agrinion | 3,998 | 3,398 | 2,099 | 4,840 |
| 22 | Zichnomyrodata | 4,154 | 3,531 | 2,214 | 5,051 |
| 23 | Tsebelia | 3,195 | 2,716 | 2,593 | 4,136 |

| Número de orden | Varietades | Precios de objetivo | Precios de intervención | Importe de la prima | Precios de intervención derivados |
|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 24 | Mavra | 3,120 | 2,652 | 2,120 | 4,065 |
| 25 | Burley EL | 2,251 | 1,688 ⁽¹⁾ | 1,219 ⁽¹⁾ | 2,748 ⁽¹⁾ |
| 26 | Virginia EL | 3,806 | 3,235 | 3,145 | 4,465 |
| 27 | Santa Fe | 1,383 | 1,176 | 0,301 | 2,034 |
| 28 | Burley Fermentado | 2,240 | 1,904 | 0,931 | 2,923 |
| 29 | Havana E | 2,878 | 2,447 | 1,952 | 3,634 |
| 30 | Round Scafati | 8,669 | 7,369 | 5,911 | 12,615 |
| 31 | Virginia E | 4,531 | 3,851 | 2,354 | 5,305 |
| 32 | Burley E | 2,965 | 2,520 | 1,398 | 3,789 |
| 33 | Virginia P | 4,263 | 3,624 | 2,354 | 4,953 |
| 34 | Burley P | 3,072 | 2,611 | 1,398 | 3,896 |

⁽¹⁾ Habida cuenta de la aplicación del artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 727/70.

ANEXO V

Cantidades máximas garantizadas por variedad y grupo de variedades para los tabacos de la cosecha 1988
(tabaco en hoja)

| Grupos y variedades (número de orden) | Cantidades máximas garantizadas (toneladas) |
|--|--|
| GRUPO I | |
| 3 Virgin D | 8 300 |
| 7 Bright | 38 000 |
| 31 Virginia E | 11 000 |
| 33 Virginia P | 3 200 |
| 17 Basmás | 30 000 |
| 18 Materini | 23 000 |
| 26 Virginia EL | 3 500 |
| Total | 117 000 |
| GRUPO II | |
| 2 Badischer Burley | 10 000 |
| 8 Burley I | 42 000 |
| 9 Maryland | 3 000 |
| 25 Burley EL | 11 000 |
| 28 Burley fermentado | 28 000 |
| 32 Burley-E | |
| 34 Burley P | 1 750 |
| Total | 95 750 |
| GRUPO III | |
| 1 Badischer Geudertheimer | 12 000 |
| 4 Paraguay | 28 000 |
| 5 Wijkerk | 2 000 |
| 6 Misionero | |
| 27 Santa Fe | |
| 29 Havanna E | 10 000 |
| 10 Kentucky | |
| 16 Round tip | |
| 30 Round Scafati | 250 |
| Total | 52 250 |
| GRUPO IV | |
| 13 Xanti-Yaka | 27 000 |
| 14 Perustitza | |
| 15 Erzegovina | |
| 19 Kaba Koulak clásico | 40 000 |
| 20 Kaba Koulak no clásico | |
| 21 Myrodata | |
| 22 Zychomyrodata | |
| Total | 67 000 |
| GRUPO V | |
| 11 Forchheimer Havanna | 20 000 |
| 12 Beneventano | |
| 23 Tsebelia | 33 000 |
| 24 Mavra | |
| Total | 53 000 |